INFEZIONI GENITALI: ISTRUZIONI PER LA/IL PAZIENTE

TAMPONE VAGINALE

- Il prelievo delle secrezioni genitali non deve avvenire nel periodo mestruale e almeno tre giorni dopo la fine delle perdite ematiche
- Non si devono eseguire lavande vaginali e non devono essere somministrati antibiotici nei 5 giorni precedenti l'esecuzione del prelievo
- Astenersi da rapporti sessuali nelle 48 ore precedenti il prelievo

RICERCA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINO-RETTALE – GRAVIDE

- Non si devono eseguire lavande vaginali e non devono essere somministrati antibiotici nei 5 giorni precedenti l'esecuzione del prelievo
- Astenersi da rapporti sessuali nelle 48 ore precedenti il prelievo

TAMPONE VULVARE

- Il prelievo delle secrezioni genitali non deve avvenire nel periodo mestruale e almeno tre giorni dopo la fine delle perdite ematiche
- Non devono essere somministrati antibiotici nei 5 giorni precedenti l'esecuzione del prelievo
- Astenersi da rapporti sessuali nelle 48 ore precedenti il prelievo
- Non lavare l'area interessata nelle 12 ore precedenti il prelievo

TAMPONE ENDOCERVICALE

- Il prelievo delle secrezioni genitali non deve avvenire nel periodo mestruale e almeno tre giorni dopo la fine delle perdite ematiche
- Non devono essere somministrati antibiotici nei **30 giorni** (PCR/NAAT) o nei **5 giorni** (*Neisseria gonorrhoeae*, coltura) precedenti l'esecuzione del prelievo
- Astenersi da rapporti sessuali nelle 48 ore precedenti il prelievo

PRELIEVO URETRALE (TAMPONE)

- Non devono essere somministrati antibiotici nei **30 giorni** (PCR/NAAT) o nei **5 giorni** (*Neisseria gonorrhoeae*, coltura) precedenti l'esecuzione del prelievo
- Astenersi da rapporti sessuali nelle 48 ore precedenti il prelievo
- Il prelievo deve essere eseguito al mattino prima della minzione o, in alternativa, due-tre ore dopo l'ultima minzione